

**Дексаметазон**  
**(розчин для ін'єкції)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Безбарвний прозорий розчин.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

дексаметазон ( дексаметазон динатрій фосфат) -2 мг.

Допоміжні речовини: натрій метабісульфіт, метил парагідроксibenзоат, пропил парагідроксibenзоат, динатрій фосфат дигідрат, вода для ін'єкцій.

**Фармакологічні властивості**

Дексаметазон проявляє виражену протизапальну та протиалергічну дію, зумовлену пригніченням вивільнення еозинофілами медіаторів запалення, індукуванням утворення ліпокортинів і зменшення кількості тучних клітин, що виробляють гістамін та гіалуронову кислоту із зменшенням проникності капілярів, стабілізацією клітинних мембран (особливо лізосомальних) та мембран органел.

**Застосування**

Лікування великої рогатої худоби, коней, овець, телят, свиней, лоша́т, котів та собак, хворих на артрит, бурсит, тендовагініт, алергічний дерматит, первинний кетоз ( у корів), ацетонемію, мастит, агалактію, екзему.

Дексаметазон може застосовуватись, як підтримуюча терапія, у випадку, коли потребується негайний лікувальний ефект.

**Дозування**

Внутрішньом'язово, внутрішньовенно або підшкірно (собаки) у дозі:

собаки, коти - 0,25-0,5 мл препарату на 5 кг маси тіла або 0,1-0,2 мг дексаметазону на 1 кг маси тіла.

При необхідності ін'єкцію повторюють через 2 доби;

велика рогата худоба, коні - 5-10 мл препарату на 400 кг маси тіла або 2,5-5 мг дексаметазону на 100 кг маси тіла. При необхідності ін'єкцію повторюють через 3-4 доби;

вівці, телята, свині, лоша́та - 1-2 мл препарату на 50 кг маси тіла або 2-4 мг дексаметазону на 50 кг маси тіла. При необхідності ін'єкцію повторюють через 3-4 доби.

Внутрішньосуглобові ін'єкції вводять тварині у дозі 0,25 - 4 мл препарату.

**Протипоказання**

Не застосовувати вагітним тваринам, а також тваринам з цукровим діабетом, хронічним нефритом, при серцевій недостатності або остеопорозі. Не застосовувати при вірусних інфекціях під час віремичної фази. Не використовувати коням для лікування ламініту.

**Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 3 доби після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяється через 1 добу після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

**Форма випуску**

Коричневі скляні флакони типу II, закриті гумовим корком під алюмінієву обкатку по 100мл.

**Зберігання**

Суше, темне, недоступне для дітей місце при температурі від 15<sup>0</sup> до 25<sup>0</sup>С

Термін придатності – 2 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

Альфасан Недерланд Б.В.

Куіперсвег 9

3440 АВ Ворден

Нідерланди

Alfasan Nederland B.V.

Kuipersweg 9

3440 AB Woerden

Netherlands

**Виробник готового продукту:**

Альфасан Інтернешнл Б.В.

П.О.Бокс78

3440 АВ Ворден

Нідерланди

Alfasan International B.V.

P.O.Box 78

3440 AB Woerden

Netherlands